

ROZPORZĄDZENIE Nr 13 /2024
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, m. Bydgoszcz, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, m. Grudziądz, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, m. Toruń, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, m. Włocławek, znińskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3, pkt 8a, pkt 8f i pkt 10, ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) oraz art. 55 ust. 1 lit. c i lit. d, art. 60 lit. b, art. 70 ust. 1 lit. b, ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE. L Nr 84 z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków, uznaje się teren powiatów w granicach administracyjnych województwa kujawsko – pomorskiego.

§2.1. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

- 1) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
 - a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub
 - b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;

2) gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych; chyba, że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum.

2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się:

1) odosobnienie drobiu w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produktywności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.


§3. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.

§4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, nie dotyczą gołębi.

§5. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów i zakazów zwartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 768, z późn. zm.).

§6.1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, m. Bydgoszcz, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, m. Grudziądz, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, m. Toruń, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, m. Włocławek, żnińskiego.

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI

Michał Sztybel

Załącznik nr 2

Gatunki docelowe ptaków objęte ryzykiem związanym z transmisją wirusa HPAI, które mogą być przekazywane do badań w kierunku HPAI:

Rodzina	Gatunek
Kaczki, gęsi i łabędzie (Anatidae)	czernica (<i>Aythya fuligula</i>)
	ogorzałka (<i>Aythya marila</i>)
	głowienka (<i>Aythya ferina</i>)
	niebiańska (<i>Netta rufina</i>)
	rożeńiec (<i>Anas acuta</i>)
	świstun (<i>Mareca penelope</i>)
	cyranka (<i>Anas querquedula</i>)
	plaskonos (<i>Spatula cypeata</i>)
	krakwa (<i>Mareca strepera</i>)
	krzyżówka (<i>Anas platyrhynchos</i>)
	cyraneczka (<i>Anas crecca</i>)
	nurogęś (<i>Mergus merganser</i>)

	szlachar (<i>Mergus serrator</i>)	
	gągoł (<i>Bucephala clangula</i>)	
	bielaczek (<i>Mergellus albellus</i>)	
	edredon (<i>Somateria mollissima</i>)	
	uhła (<i>Melanitta fusca</i>)	
	markaczka (<i>Melanitta nigra</i>)	
	lodówka (<i>Clangula hyemalis</i>)	
	ohar (<i>Tadorna tadorna</i>)	
	gęsiówka egipska (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)	
	gęś mała (<i>Anser erythropus</i>)	
	gęś białogłowa (<i>Anser anser</i>)	
	gęś zbożowa (<i>Anser fabalis</i>)	
	gęś tundrowa (<i>Anser rossicus</i>)	
	bernikla kanadyjska (<i>Branta canadensis</i>)	
	gęś krótkodzioba (<i>Anser brachyrhynchus</i>)	
	bernikla białolica (<i>Branta leucopsis</i>)	
	bernikla obrożna (<i>Branta bernicla</i>)	
	gęś białoczelna (<i>Anser albifrons</i>)	
łabędź czarnodzioby (<i>Cygnus columbianus</i>)		
łabędź krzykliwy (<i>Cygnus cygnus</i>)		
łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>)		
Perkozowe (Podicipedidae)	zauśnik (<i>Podiceps nigricollis</i>)	
	perkoz rdzawoszyi (<i>Podiceps ruficollis</i>)	
	perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>)	
	perkozek (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	
Bociany (Ciconiidae)	bocian biały (<i>Ciconia ciconia</i>)	
Czaplowate (Ardeidae)	bąk (<i>Botaurus stellaris</i>)	
	czapla nadobna (<i>Egretta garzetta</i>)	
	czapla biała (<i>Egretta alba</i>)	
	czapla siwa (<i>Ardea cinerea</i>)	
Kormorany (Phalacrocoracidae)	kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	
Ptaki drapieżne (Accipitridae, Falconidae, Strigidae)	bieлик (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	
	rybołów (<i>Pandion haliaeetus</i>)	
	blotniak stawowy (<i>Circus aeruginosus</i>)	
	myszolew włochaty (<i>Buteo lagopus</i>)	
	myszolew (<i>Buteo buteo</i>)	
	puszczyk (<i>Falco tinnunculus</i>)	
	sokół wędrowny (<i>Falco peregrinus</i>)	
	jastrząb (<i>Accipiter gentilis</i>)	
	krogulec (<i>Accipiter nisus</i>)	
	uszatka (<i>Asio otus</i>)	
	puszczyk (<i>Strix aluco</i>)	
	puchacz (<i>Bubo bubo</i>)	
		wodnik (<i>Rallus aquaticus</i>)
	Łyski, derkacze i chruściele (Rallidae)	kokoszka (<i>Gallinula chloropus</i>)
łyska (<i>Fulica atra</i>)		

Załącznik nr 2

Bekasowate (Scolopacidae)	samotnik (<i>Tringa ochropus</i>)
	ostrzygojad (<i>Haematopus ostralegus</i>)
	sieweczka obrożna (<i>Charadrius hiaticula</i>)
	sieweczka rzeczna (<i>Charadrius dubius</i>)
Mewy, rybitwy i podobne (Laridae)	mewa siodłata (<i>Larus marinus</i>)
	mewa srebrzysta (<i>Larus argentatus</i>)
	mewa białogłowa (<i>Larus cachinnans</i>)
	mewa czarnogłowa (<i>Ichthyaeetus melanocephalus</i>)
	mewa siwa (<i>Larus canus</i>)
	śmieszka (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)
	rybitwa rzeczna (<i>Sterna hirundo</i>)
	rybitwa białoczelna (<i>Sternula albifrons</i>)
rybitwa czubata (<i>Thalasseus sandvicensis</i>)	
Krukowate (Corvidae)	sroka (<i>Pica pica</i>)
	kawka (<i>Coloeus monedula</i>)
	gawron (<i>Corvus frugilegus</i>)
	wrona siwa (<i>Corvus cornix</i>)
	kruk (<i>Corvus corax</i>)
Drozdzy (Turdidae)	kwiczoł (<i>Turdus pilaris</i>)
	kos (<i>Turdus merula</i>)
	śpiewak (<i>Turdus philomelos</i>)
Kurowate (Phasianidae)	bażant (<i>Phasianus colchicus</i>)
Gółębiowate (Columbidae)	grzywacz (<i>Columba palumbus</i>)
	sierpówka (<i>Streptopella decaocto</i>)

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- 1. Przetrzymywać drób w izolacji od dzikich ptaków;**
- 2. Przechowywać paszę i ściółkę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z gryzoniami, dzikim ptactwem oraz ich odchodami;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie i ich odchody;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa w których utrzymywany jest drób.**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu


Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

UWAGA


W przypadku gospodarstw utrzymujących więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie istnieje obowiązek posiadania i wdrożenia planu bioasekuracji uwzględniającego profil produkcji gospodarstwa oraz co najmniej:

- a) podziału gospodarstwa na strefy „czyste” i „brudne” dla osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu**
- b) procedur wprowadzania do gospodarstwa drobiu, pasz, ściółki, materiałów pomocniczych oraz sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w chowie i hodowli**
- c) procedur czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu i wyposażenia oraz higieny osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu**
- d) procedur zwalczania szkodników**
- e) procedur rozdziału poszczególnych stad drobiu oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu drobiu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego**


GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?




1 Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!




2 Nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione!




3 Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.




4 Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielem przydomowych kurników, czy myśliwym).




5 Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




6 Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.




7 Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.




8 Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wnieśieniem do kurnika.




9 Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.



10 Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynfekcja i deratyzacja.



11 Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.




12 Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skręty szyi, drgawki, biegunka, duszność) Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!

OPRACOWANO PRZEZ



KRAJOWA RADA DROBIARSTWA
I ZBA GOSPODARCZA

WE WSPÓŁPRACY





DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 2225

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI¹⁾

z dnia 9 października 2023 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzania środkami związanymi
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków**

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzania środkami związanymi z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 768) w § 1:

1) w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek, gęsi i ptaków bezgrzebieniowych, w izolacji od dzikich ptaków,”;

2) w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W gospodarstwach utrzymujących drób prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h oraz n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazuje się ponadto:”;

b) w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego –”;

c) w pkt 13 po wyrazie „posiadanie” dodaje się wyrazy „i wdrożenie”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: *wz. R. Romanowski*

¹⁾ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

